

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS DERIVACIONES AL PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL HOSPITAL DE DÍA DE USMIJ-HD AGS SUR SEVILLA. HOSPITAL DE VALME.

Autores : Estévez Fernández, M; Romero Gómez, C; Barrera Piñero, J.

UGC SALUD MENTAL AGS SUR SEVILLA. UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL DEL HOSPITAL DE VALME.

Objetivos


- Describir las características de los niño/as y adolescentes derivados al Programa de Terapia Ocupacional en la modalidad de Observación Diagnóstica.
- Examinar las Sospechas Diagnósticas más frecuentes.

Métodos

Análisis retrospectivo de una muestra de 126 niños/as y adolescentes (n=126) que acuden al Hospital de Día desde Septiembre 2014 a Septiembre 2015. Las variables estudiadas son sexo, grupo de edad, unidades de salud mental comunitaria de procedencia, lugar en la patria, estado familiar, sospecha diagnóstica, confirmación diagnóstica y evento traumático. Grupo de edad: 0-3 años, 4-6 años, 7-11 años, 12-18 años. Estado Familiar: familia común/típica, f. adoptiva, f. monoparental, padres separados. Sospecha diagnóstica: Asperger, TEA, TEL, TDAH, TC, Otros. Evento traumático: Adopción, duelo, situación vital de estrés, separación.

Resultados

Los resultados muestran una relación estadísticamente significativa entre género 79.4% varones. El intervalo de edad de mayor demanda asistencial es de 7 a 11 años. Destacar que el 77.8% conviven en un ambiente familiar común/típica, 14.3% familias separadas. Un 34.1% son hijos únicos. En cuanto a la sospecha diagnóstica un 38.1% son TEA, 19.8% TDAH, estos porcentajes representan a 73 pacientes de la muestra estudiada; seguido de los Asperger con 11.11% y los Trastornos de Conducta con 9.5%. De 48 niños/as y adolescentes con sospecha de TEA los resultados revelan que se confirman 37 TEA. De 25 sospechas de TDAH se confirman 12. Trastornos de conducta se mantiene los datos. Un 62.7% no hay evento traumático.



Conclusiones

Cuando la derivación es por sospecha de Trastorno de conducta (TC) o por Trastornos del Espectro Autista (TEA) se confirman estos diagnósticos.

Tanto en TDAH como en el Trastorno de Conducta existe correlación con un evento traumático. Los datos determinan que la influencia de un evento traumático está más presente en el rango de edad de 7 a 11 años siendo la causa más frecuente la exposición a situaciones vitales de estrés.